

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

T +352 2468-1

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman

www.hopitauxschuman.lu


SITES UTILES

www.acteurdemasante.lu

RS HÔPITAUX
ROBERT
SCHUMAN



**INFORMATION RELATIVE À LA
PRÉVENTION DES INFECTIONS
RESPIRATOIRES À VRS CHEZ LE
NOUVEAU-NÉ PAR BEYFORTUS®**



**PRÉVENTION
INFECTIONS**

VRS

Ref. Nr. Article Orbis: 1026928

Description : Flyer Prévention des infections respiratoires (FR)

Imprimé au Luxembourg

W. 10 2023 - Ed. 10 2023

hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

QU'EST-CE QU'UNE INFECTION À VRS ?

Le virus respiratoire syncytial (VRS) peut provoquer une bronchiolite. La bronchiolite est une infection des voies respiratoires très contagieuse. La période épidémique débute en automne et se termine à la fin de l'hiver. Elle peut dans certains cas entraîner une hospitalisation, voire un séjour en réanimation.

QU'EST-CE QUE LE BEYFORTUS® ?

Il s'agit d'un médicament préventif qui diminue le risque d'infection à VRS chez les enfants. Il contient un anticorps (ce qui le différencie d'un vaccin), le nirsevimab qui cible le VRS.

COMMENT EST-IL ADMINISTRÉ ?

Votre pédiatre déterminera la dose à administrer en fonction du poids de votre enfant et pratiquera une injection dans le muscle de la cuisse. Une seule injection est efficace, au minimum 5 mois et permet de couvrir une saison épidémique entière. L'injection peut être réalisée en même temps que d'autres vaccins de l'enfant.

L'injection sera indiquée dans le carnet de vaccination de votre enfant.



QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS ?

Comme tout médicament, le Beyfortus® peut parfois entraîner des effets indésirables. Ils apparaissent généralement dans les jours suivants l'injection et sont de faible intensité et de courte durée.

Les effets indésirables possibles sont :

- Une éruption cutanée,
- Une réaction au niveau de l'endroit où l'injection a été réalisée (rougeur, gonflement, douleur),
- De la fièvre.

Si vous observez un de ces signes chez votre enfant après l'injection, prévenez l'équipe soignante ou appelez votre médecin.

AVEC OU SANS BEYFORTUS®, N'OUBLIEZ PAS D'APPLIQUER LES MESURES DE PRÉVENTIONS DE BASE :

- Lavez-vous les mains régulièrement,
- Aérez la chambre et les pièces de vie,
- Évitez toute exposition au tabac,
- Évitez les endroits confinés et très fréquentés (supermarchés, transports en communs, etc.),
- Évitez les contacts avec les personnes enrhumées,
- Portez un masque si vous êtes malade,
- Évitez le partage de tétines, biberons et jouets avec d'autres enfants et lavez les régulièrement.