

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
T +352 286 911

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.hopitauxschuman.lu


RS HÔPITAUX
ROBERT
SCHUMAN



INFORMATION PATIENT



BREEZHALER



1. OUVRIR L'INHALATEUR

Tenez fermement la base de l'inhalateur et inclinez l'embout buccal, l'inhalateur est alors ouvert.

2. PRÉPARER LA GÉLULE

Immédiatement avant utilisation, avec les mains sèches, sortez une gélule de la plaquette thermoformée.

3. INSÉRER LA GÉLULE

Placez la gélule dans son logement. Ne jamais placer une gélule directement dans l'embout buccal.

4. FERMER L'INHALATEUR

Refermez l'inhalateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

5. PERCER LA GÉLULE

Tenez l'inhalateur en position verticale avec l'embout buccal vers le haut. Percez la gélule en appuyant fermement sur les deux boutons latéraux en même temps. Cette étape ne doit être effectuée qu'une fois. Vous devez entendre un clic lorsque la gélule est percée.

Relâchez complètement les boutons latéraux.

6. EXPIRER

Expirez à fond avant de placer l'embout buccal dans votre bouche. Ne soufflez pas dans l'embout buccal.

7. INHALER LE MÉDICAMENT

Pour inhaler profondément le médicament dans vos voies aériennes, les boutons latéraux doivent être orientés vers la gauche et la droite. N'appuyez pas sur les boutons latéraux. Placez l'embout buccal dans votre bouche et serrez les lèvres. Inspirez rapidement mais régulièrement et aussi profondément que possible.

8. RETENIR SA RESPIRATION

Après avoir inhalé le médicament, retirez l'inhalateur de votre bouche et retenez votre respiration pendant au moins 5 à 10 secondes ou aussi longtemps que possible.

9. EXPIRER

Puis ouvrez l'inhalateur pour voir s'il reste de la poudre dans la gélule. S'il en reste, refaites la manipulation.

10. FERMER L'INHALATEUR

En général, la gélule peut être vidée en une ou deux inhalations.

NOTE

Lorsque vous inspirez dans l'inhalateur, la gélule tourne dans le logement et vous devez entendre un bourdonnement. Vous sentirez un goût sucré lorsque le médicament pénétrera dans vos poumons.

Informations supplémentaires :

Des morceaux minuscules de la gélule peuvent parfois traverser le filtre et entrer dans votre bouche. Si cela se produit, vous pourrez sentir ces morceaux sur votre langue. Le fait d'avaler ou d'inhaler ces morceaux ne présente aucun risque. La possibilité de rupture de la gélule est augmentée si la gélule est percée accidentellement plus d'une fois.

Si vous n'entendez pas de bourdonnement :

La gélule est peut-être coincée dans son logement.

Dans ce cas :

- Ouvrez l'inhalateur et libérez avec précaution la gélule en tapotant la base de l'inhalateur. N'appuyez pas sur les boutons latéraux.

- Inhalez à nouveau le médicament en répétant les étapes 8 et 9

COMMENT NETTOYER VOTRE INHALATEUR :

L'inhalateur doit être nettoyé une fois par semaine :

- Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'embout buccal avec un tissu propre et sec non pelucheux pour éliminer toute la poudre.

- Ne lavez pas l'inhalateur avec de l'eau, il doit rester sec.

- Ne démontez pas l'inhalateur.