

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

T +352 286 911

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman

www.hopitauxschuman.lu

NÜTZLICHE LINKS

www.acteurdemasante.lu



INFORMATIONEN ZUR PRÄVENTION VON RSV-INFEKTIONEN DER ATEMWEGE DURCH ABRYSCO®



PRÄVENTION VON RSV- INFEKTIONEN

Ref. Nr. Article Orbis: 1028861

Beschreibung : Flyer RSV - ABRYSCO (DE)

Gedruckt in Luxemburg

W. 10 2024 - Ed. 09 2026

hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

WAS IST EINE RSV-INFEKTION?

Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) kann Symptome hervorrufen, die mit denen einer Erkältung vergleichbar sind, aber auch zu Bronchiolitis führen. Die Bronchiolitis ist hoch ansteckend und betrifft in der Regel Kinder unter 2 Jahren. Die Bronchiolitis-Epidemie beginnt im Herbst und endet am Ende des Winters. Auch wenn die Krankheit im Allgemeinen nicht schwerwiegend ist, kann sie in einigen Fällen einen Krankenhausaufenthalt oder sogar die Aufnahme auf eine Intensivstation nach sich ziehen.

WAS IST ABRYSSVO®? FÜR WEN IST ES BESTIMMT?

Abrysvo® ist ein Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren, zum Schutz vor Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch das RSV verursacht werden.

Er ist auch zur Verwendung bei schwangeren Frauen (zwischen der 24. und 36. Schwangerschaftswoche) zugelassen, um ihre Säuglinge ab der Geburt bis zum Alter von sechs Monaten vor RSV zu schützen.

Der Impfstoff enthält die RSV-F-Antigene der Untergruppen A und B, die in präfusionierter Form stabilisiert sind.

WIE WIRD ABRYSSVO® VERABREICHT?

Ihr Arzt injiziert die zu verabreichende Dosis (0,5 mL) in Ihren Oberarmmuskel. Die Injektion kann zusammen mit dem quadrivalenten Impfstoff gegen die saisonale Grippe verabreicht werden. Die Impfung wird in Ihrem Impfpass vermerkt.

VOR DER VERABREICHUNG VON ABRYSSVO® IST ES WICHTIG, DASS SIE IHREN ARZT INFORMIEREN, WENN :

- Sie eine Allergie gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels haben.
- Sie Probleme mit Blutungen oder eine niedrige Anzahl an Blutplättchen haben.
- Sie zu Blutergüssen neigen oder mit einem gerinnungshemmenden Medikament (zur Blutverdünnung und zur Verhinderung von Blutgerinnseln) behandelt werden.

WELCHE MÖGLICHEN NEBENWIRKUNGEN KÖNNEN AUFTRETEN?

Wie bei allen Arzneimitteln kann es durch Abrysvo® zu Nebenwirkungen kommen. Diese treten in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Injektion auf und sind von geringer Intensität und kurzer Dauer.

Mögliche Nebenwirkungen sind:

- eine Reaktion an der Stelle der Injektion (Rötung, Schwellung, Schmerzen)
- Kopfschmerzen
- Muskelschmerzen

WIE BEI ALLEN INJIZIERBAREN ARZNEIMITTELN, KANN EINE ALLERGISCHE REAKTION AUFTRETEN. DIE HAUPTSYMPTOME SIND:

- Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken
- Schwellung des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder des Rachens
- Starker Juckreiz der Haut, der mit einer Rötung und/oder kleinen Bläschen einhergehen kann

Wenn Sie eines dieser Anzeichen nach der Injektion beobachten, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder rufen Sie die 112 an.

