

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

T +352 286 911

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman

www.hopitauxschuman.lu

SITES ÚTEIS

www.acteurdemasante.lu



**INFORMAÇÕES SOBRE
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES
RESPIRATÓRIAS POR VSR NO
RECÉM-NASCIDO COM BEYFORTUS®**



**PREVENÇÃO
DE INFECÇÕES
POR VSR**

Ref. Nr. Article Orbis: 1030828

Description : Flyer Prevencao infecoes por VSR (PT)

Imprimé au Luxembourg

W. 01 2026 - Ed. 09 2026

hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

O QUE É UMA INFEÇÃO POR VSR?

O vírus sincicial respiratório (VSR) pode causar bronquiolite. A bronquiolite é uma infecção altamente contagiosa das vias respiratórias. O período epidémico começa no outono e termina no fim do inverno. A bronquiolite pode, em certos casos, levar à hospitalização, ou mesmo a um internamento nos cuidados intensivos.

O QUE É BEYFORTUS®?

Beyfortus® é um medicamento preventivo que reduz o risco de infecção por VSR nas crianças. Contém um anticorpo (o que o diferencia de uma vacina), o nirsevimab, que tem como alvo o VSR.

COMO É ADMINISTRADO?

O pediatra determinará a dose a administrar de acordo com o peso do seu filho e aplicará uma injeção no músculo da coxa. Uma única injeção é eficaz durante pelo menos cinco meses e permite cobrir toda uma época epidémica. A injeção pode ser administrada ao mesmo tempo que as outras vacinas da criança. A injeção será registada no boletim de vacinas do seu filho.

QUAIS SÃO OS POTENCIAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS?

Como todos os medicamentos, Beyfortus® pode por vezes ter efeitos indesejáveis. Estes surgem geralmente nos dias que se seguem à injeção e são de curta duração. Os efeitos secundários possíveis incluem:

- erupção cutânea,
- reação no local da injeção (vermelhidão, inchaço, dor)
- febre.

Se notar algum destes sinais no seu filho após a injeção, informe a sua equipa de saúde ou contacte o seu médico.

COM OU SEM BEYFORTUS®, LEMBRE-SE DAS SEGUINTE MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS:

- Lavar as mãos regularmente,
- Arejar o quarto e as áreas de estar,
- Evitar a exposição ao tabaco,
- Evitar locais confinados e movimentados (supermercados, transportes públicos, etc.),
- Evitar o contacto com pessoas constipadas,
- Usar uma máscara se estiver doente,
- Evitar partilhar chupetas, biberões e brinquedos com outras crianças e lavá-los regularmente.

