

## WANN SOLLTE MAN SCHNELL KONTAKT AUFNEHMEN?

Wenn Ihr Kind eines der nachfolgend aufgezählten Symptome aufweist:

- Anhaltendes Fieber ( $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ) nach 36 Stunden
- Starker, blutiger Ausfluss
- Auftreten einer Ohrenentzündung
- Anhaltende Ohrenschmerzen

Verständigen Sie den Chirurgen unter der auf dem Rezept angegebenen Nummer oder die Kinderabteilung unter folgender Nummer: +352 2862 6521

**Wir sind für Sie da, falls Sie Fragen haben.**

**Danke für Ihr Vertrauen.**

**Das gesamte Team wünscht Ihnen eine angenehme Rückkehr nach Hause.**

### Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
T +352 286 911  
[www.facebook.com/hopitauxrobertschuman](https://www.facebook.com/hopitauxrobertschuman)  
[www.hopitauxschuman.lu](http://www.hopitauxschuman.lu)

### Pädiatrische Station

T +352 2862 6521

### Nützliche Website

[www.acteurdemasante.lu](http://www.acteurdemasante.lu)

### Notizen

Ihre Fragen an den Arzt und die bei seinem Besuch erhaltenen Informationen:

---

---

---

---

---

---

---

Imprimé au Luxembourg  
W. 03 2026 – Ed. 07 2026

Réf. Nr. article Orbis: 1030701  
Description: Flyer drains  
transtympaniques DE - Pédiatrie DE



## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BEGLEITUNG IHRES KINDES RÜCKKEHR NACH HAUSE NACH DEM EINSATZ EINES



## Liebe Eltern,


bei Ihrem Kind wurde ein Paukenröhrchen eingesetzt.

Hier erhalten Sie ein paar hilfreiche Informationen und Empfehlungen, damit Sie seine Rückkehr nach Hause optimal begleiten können.

## NACH DER OPERATION

Es kann zu Sekretionen oder Ausflüssen aus den operierten Ohren kommen.

Nur an der äußeren Ohrmuschel dürfen die Sekretionen mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser entfernt werden.



## GUT ZU WISSEN

Das eingesetzte Paukenröhrchen bleibt in der Regel bis zu 18 Monate im Ohr. Normalerweise wird es vom Trommelfell abgestoßen, und die hergestellte Öffnung schließt sich grundsätzlich von selbst wieder.

Das Vorhandensein des Paukenröhrchens beeinträchtigt den Alltag nicht. Ihr Kind kann seine Aktivitäten wieder aufnehmen, sobald dies ärztlich erlaubt ist.

## VOR DER ENTLASSUNG

Achten Sie darauf, dass Sie bei dieser Visite Folgendes erhalten:

- einen Termin für die nächste Nachsorgeuntersuchung
- eine ärztliche Verordnung
- eine Verordnung für maßgefertigte Ohrstöpsel
- die ärztlichen Atteste Ihres Kindes für die Krippe, die Schule oder den Sportunterricht, usw.
- das Attest für Ihren Arbeitgeber

Scheuen Sie sich nicht, dem Chirurgen die Fragen zu stellen, die Sie für wichtig halten.

Die Wiederaufnahme des gewöhnlichen Lebens (Krippe, Schule) ist bereits am Folgetag möglich.

Indem Sie den QR-Code scannen,  
gelangen Sie zum Zufriedenheitsfragebogen  
in Ihrer Sprache.



Danke für Ihre Teilnahme. Sie unterstützt uns bei der  
Verbesserung der Behandlungsqualität.

## BEI IHREM AUFBRUCH

Bitte, verständigen Sie das Pflegeteam, bevor Sie die Station verlassen, und geben Sie, falls relevant, Ihren Zutrittsausweis zurück.

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE POSTOPERATIVE PHASE

Beachten Sie zuhause folgende Verhaltensregeln:

- Verabreichen Sie das Schmerzmittel nach Bedarf, unter Berücksichtigung der Anweisungen des Chirurgen oder der Beschwerden Ihres Kindes.
- Führen Sie nichts in die Ohren ein, es sei denn, dies wurde vom Chirurgen verordnet.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt der Ohren mit Wasser, vor allem, während der ersten 10 Tage. Verwenden Sie anschließend maßgefertigte Ohrstöpsel.
- Reinigen Sie die Ohren nicht mit Wattestäbchen.
- Meiden Sie in den Folgetagen der Operation den Kontakt mit Menschen, die von ansteckenden Krankheiten betroffen sind.

## TIPPS FÜR EINE PROBLEMLOSE RÜCKKEHR NACH HAUSE

- Planen Sie für den Rest des Tages eine ruhige Beschäftigung zu Hause (Lesen, Malen, Film).
- Verzichten Sie auf Ausgänge oder Besuche.
- Achten Sie aufmerksam auf Anzeichen von Müdigkeit oder Unbehagen.
- Schaffen Sie eine beruhigende Umgebung: Ein Kuscheltier oder eine vertraute Decke kann ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln.