

PRÉCAUTIONS

- **Informez tous les professionnels de santé** impliqués dans votre prise en charge (médecin, dentiste, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute...) que vous prenez un anticoagulant. Cela permet de prendre les précautions nécessaires, notamment avant des soins à risque de saignement (soins dentaires, intervention chirurgicale ou examen invasif).
- Ayez toujours sur vous votre **carte-alerte AOD** (fournie dans la boîte du médicament) ainsi qu'une **liste à jour de vos traitements**.
- **Certains médicaments peuvent modifier l'effet de votre anticoagulant.**
Ne prenez aucun nouveau médicament (avec ou sans ordonnance) sans en parler à votre médecin ou pharmacien. En cas de douleur ou de fièvre, privilégiez le paracétamol. Les anti-inflammatoires peuvent augmenter le risque de saignement.
- Ne modifiez pas la dose prescrite et **n'arrêtez pas le traitement sans avis médical**.
- Consultez rapidement votre médecin en cas de :
 - Douleur, gonflement ou chaleur au niveau d'une jambe.
 - Douleur au niveau de la poitrine ou difficultés inhabituelles à respirer.
- Ne prenez pas ce médicament dans les cas suivants :
 - Saignement en cours (par exemple lié à un ulcère de l'estomac).
 - Maladie grave du foie (insuffisance hépatique).
 - Grossesse ou allaitement.
 - Présence d'une valve cardiaque artificielle.

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
T +352 286 911
www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.hopitauxschuman.lu

En cas de besoin, contactez votre médecin habituel.

Si votre médecin habituel n'est pas joignable, notre service d'urgences adultes est ouvert aux horaires suivants:

- ZithaKlinik : 08h00 - 17h00
- Hôpital Kirchberg : 07h00 - 17h00
- les services d'urgences gynécologiques et obstétricales : 24h24

En cas d'urgence vitale contactez le 112

LIENS UTILES

www.acteurdemasante.lu

INFORMATIONS PRATIQUES

- Évitez les sports de contact violents ou les activités à risque (Judo, VTT, ski,...).
- Limitez autant que possible la consommation d'alcool et de tabac.
- Utilisez une brosse à dents souple et évitez de vous brosser les dents trop énergiquement.
- Privilégiez un rasoir électrique pour vous raser.
- Soyez prudent lors de la manipulation d'objets coupants.
- Évitez de consommer du pamplemousse (fruit ou jus) pendant votre traitement.
- En cas de voyage, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant le départ pour organiser votre traitement et obtenir des conseils adaptés.




INFORMATION POUR LES PATIENTS : VOTRE TRAITEMENT ANTICOAGULANT POUR LA FIBRILLATION AURICULAIRE (FA)



ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS (AOD)

XARELTO® (RIVAROXABAN) 15 MG ET 20 MG COMPRIMÉS



PROPRIETES

Le Xarelto® est un **médicament anticoagulant** qui fluidifie le sang pour prévenir la formation de caillots sanguins.

Ce traitement vous a été prescrit à la suite d'un diagnostic de **fibrillation auriculaire (FA)**. Cela est un trouble du rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner la formation de caillots dans le sang, avec un risque d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Le traitement anticoagulant permet de réduire ce risque.

MODE D'EMPLOI

- Prenez **1 comprimé une fois par jour**, toujours à la même heure. La dose du comprimé (soit 15 mg ou 20 mg) dépendra de votre fonction rénale.
- Ce comprimé doit être pris **pendant ou après le repas**, avec un verre d'eau.
- Votre médecin vous indiquera combien de temps vous devez prendre ce médicament. **Ne l'arrêtez pas sans avis médical.**

EN CAS D'OUBLI D'UNE DOSE

Si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle de prise : prenez immédiatement votre médicament. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Si plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure habituelle, ne prenez pas la dose oubliée. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle. **Ne doublez pas les prises.**

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Le principal effet secondaire du Xarelto® est un **risque de saignement** (le sang met plus de temps à coaguler).

Cela peut se manifester par :

- Saignements abondants ou qui durent plus de 15 minutes (nez, gencives lors du brossage des dents, coupure ou blessure).

Il existe également un risque plus rare de **saignement interne**, qui peut se manifester par :

- Des douleurs abdominales.
- **Des selles noires et malodorantes.**
- Sang dans les **urines** (urines rouges ou foncées).
- **Des vomissements ou des crachats avec du sang.**
- Hématomes (bleus) fréquents.
- Des petites taches rouges sur la peau.
- **Un mal de tête soudain ou inhabituel.**
- Pâleur, essoufflement ou fatigue inhabituelle.
- Après une chute, surtout en cas de choc à la tête.

Si vous présentez l'un de ces signes, contactez rapidement votre médecin traitant ou le 112 en cas d'urgence.

ETIQUETTE PATIENT

Coller l'étiquette du patient ici

